

La cistite per l'**86% dei casi è sostenuta dal batterio intestinale Escherichia coli** che infetta la mucosa della vescica migrando dall'intestino alla vescica ed ancorandosi alla mucosa con due tipi di fimbrie Tipo 1 e di Tipo P

| | MIRTILLO ROSSO blocca le fimbrie di Tipo P (dosato in mg di proantocianidine) | D-Mannosio blocca le fimbrie di Tipo 1 (in mg) | PROBIOTICO contrasta la crescita del coli | ALTRI ATTIVI |
|---|--|---|---|---|
|  LACTOFLORENE CIST 10 buste Duocam® Montefarmaco | 36 mg | 1000 mg | Lactobacillus Paracasei LC11 | |
|  CISTIFLUX A PLUS 14 buste Sofar | 36 mg | 500 mg | | |
|  CISTISET ADVANCE 14 compresse Corman | 36 mg | 200 mg | | Ononide |
|  FLORBERRY 10 buste Bracco | 36 mg | | Lactobacillus Paracasei LPC37 Lactobacillus Paracasei B21060 | Frutto-olisaccaridi Arabino galattano |
|  LFP UROTAB 20 compresse Unifarco | 27 mg | | Lactobacillus L. Fermentum DSM25176 | Uva ursina |
|  MONURELLE 15 capsule Zambon | | | | gelatina xiloglucano hibiscus propoli |
|  ACIDIF PLUS 14 compresse Bio Health | | | | L-Metionina, Hibiscus, Boswellia |
|  CYSTIS RAPID GSE 30 compresse Prodeco | | | | Semi di Pompelmo, Uva ursina, Erica, Pilosella, Ononide |